Strigogyps

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Strigogyps (лат.) — род вымерших птиц из отряда кариамообразных из среднего эоцена — раннего олигоцена Франции и Германии. В род включают 4 вида.

Содержание

Описание
Систематика
См. также
Примечания

Описание

Strigogyps был размером с крупную курицу с массой не более 1 килограмма. Судя по соотношению длины костей крыла и ноги, была нелетающей птицей. Её ноги не приспособлены для бега, поэтому предполагается сидячий образ жизни, похожий на таковой у трубачей. Найденные мягкие ткани с остатками содержимого кишечника, представляющего собой зёрна растений, указывает, что птица была по крайней мере факультативно растительноядной[1].

Систематика

Strigogyps robustus

† *Strigogyps*

Образец *Strigogyps sapea*

Научная классификация

промежуточные ранги

Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Подцарство: Эуметазои
Без ранга: Двусторонне-симметричные
Без ранга: Вторичноротые
Тип: Хордовые
Подтип: Позвоночные
Инфратип: Челюстноротые
Надкласс: Четвероногие
Класс: Птицы
Подкласс: Веерохвостые птицы
Инфракласс: Новонёбные
Отряд: Кариамообразные
Семейство: † ***Ameghinornithidae***
Mourer-Chauviré, 1981
Род: † ***Strigogyps***

Типовым видом является *Strigogyps dubius*, описанный Ш. Гайярдом в 1908 году. Автор описания отнёс новый таксон к семейству Sophiornithidae в пределах отряда совообразных. Вид был основан на единственной окаменелой цевке, найденной в фосфоритовых отложених Франции[2]. Сама окаменелость была уничтожена при бомбардировке Мюнхена во время Второй мировой войны; сохранились только слепки. В 1939 году Гайярд описал второй вид *Strigogyps*, *S. minor*, основанный на плечевой кости, двух коракоидах и двух пряжках, также из Франции[3]. В 1981 году французский палеонтолог Мурер-Шовире повторно описал *Strigogyps minor* под названием *Ameghinornis minor*, как единственного представителя нового подсемейства Ameghinornithinae в пределах семейства фороракосовых[4]. Позднее *Ameghinornis* был помещен в собственное семейство Ameghinornithidae. В 1987 году Дитер Петерс назвал и описал ещё один монотипичный вид из этого семейства — *Aenigmavis sapea*, основанный на почти полном скелете из карьера Мессель в Германии[5]. В 2005 Г. Майр обнаружил, что *Aenigmavis sapea* является видом *Strigogyps*, *S. sapea*, а *Ameghinornis* является младшим синонимом *Strigogyps dubius*, поскольку оба образца происходили из одной местности во Франции и являлись почти идентичными[6].

Реконструкция

Международное научное название

Strigogyps Gaillard, 1908

Виды

- † *Strigogyps dubius* Gaillard, 1908 **typus**
- † *Strigogyps minor* Gaillard, 1939
- † *Strigogyps robustus* Mayr, 2007
- † *Strigogyps sapea* Peters, 1987

Геохронология

47,8—28,1 млн лет

FW 191552

Систематика на Викивидах (https://species.wikimedia.org/wiki/Strigogyps?uselang=ru)

Изображения на Викискладе (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Strigogyps)

В 1935 году К. Ламбрехт описал стервятника из Нового Света, *Eocathartes robustus*, и птицу-носорога, *Geiseloceros robustus*, из среднего эоцена (лютетский ярус) из Гейзельтальского бассейна Германии. Каждый вид был основан на единственном образце, которые были найдены очень близко друг к другу[7]. Г. Майр обнаружил, что образцы представляют один и тот же вид, являющийся синонимом *Strigogyps*, *S. robustus*[8].

Исследования 2003 и 2005 годов показали, что *Strigogyps* является базальным представителем кариамообразных, и не особенно близок к фороракосовым[6][9]. *Salmila robusta*, другая птица из карьера Мессель, оказалась более базальной, чем *Strigogyps*, и клада, состоящая из *Salmila* и Cariamae, является сестринским таксоном семейства трубачей (Psophiidae) в пределах отряда журавлеобразных (Gruiformes)[10].

См. также

- Карьер Мессель

Примечания

1. *Mayr G., Richter G.* Exceptionally preserved plant parenchyma in the digestive tract indicates a herbivorous diet in the Middle Eocene bird *Strigogyps sapea* (Ameghinornithidae) (https://link.springer.com/article/10.1007/s12542-010-0094-5) (англ.) // Paläontologische Zeitschrift. — 2011. — Vol. 85, no. 3. — P. 303–307. — doi:10.1007/s12542-010-0094-5 (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs12542-010-0094-5).
2. *Gaillard C.* Les oiseaux des Phosphorites du Quercy (фр.) // Annales del'Université de Lyon (Nouvelle Série). — 1908. — Vol. 23. — P. 1—178.
3. *Gaillard C.* Contribution a l'étude des oiseaux fossiles [Contribution to the study of fossil birds] (фр.) // Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. — 1939. — Vol. 15, n^{o} 2. — P. 1—100.
4. *Mourer-Chauviré C.* Première indication de la présence de Phorusrhacidés, famille d'oiseaux géants d'Amérique du Sud, dans le Tertaire européen: *Ameghinornis* nov. gen. (Aves, Ralliformes) des Phosphorites du Quercy, France (фр.) // Géobios. — 1981. — Vol. 14. — P. 637—647.
5. *Peters D. S.* Ein "Phorusrhacidae" aus dem Mittel-Eozän von Messel (Aves: Gruiformes: Cariamae) (нем.) // Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon. — 1987. — Bd. 99. — S. 71—87.
6. *Mayr G.* "Old World phorusrhacids" (Aves, Phorusrhacidae): a new look at *Strigogyps* (*"Aenigmavis"*) *sapea* (Peters 1987) (англ.) // PaleoBios (Berkeley). — 2005. — Vol. 25, no. 1. — P. 11—16.
7. *Lambrecht K.* Drei neue Vogelformen aus dem Lutétian des Geiseltales (нем.) // Nova Acta Leopoldina, Neue Folge. — 1935. — Bd. 3. — S. 361—367.
8. *Mayr G.* Synonymy and actual affinities of the putative Middle Eocene "New World vulture" *Eocathartes* Lambrecht, 1935 and "hornbill" *Geiseloceros* Lambrecht, 1935 (Aves, Ameghinornithidae) (https://www.senckenberg.de/wp-content/uploads/2019/09/geiseloceros.pdf) (англ.) // Paläontologische Zeitschrift. — 2007. — Vol. 81, no. 4. — P. 457—462.
9. *Alvarenga H. M. F., Höfling E.* Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes) (https://www.scielo.br/pdf/paz/v43n4/17491.pdf) (англ.) // Papéis Avulsos de Zoologia. — 2003. — Vol. 43, no. 4. — P. 55—91. — ISSN 0031-1049 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0031-1049).
10. *Mayr G.* A new specimen of *Salmila robusta* (Aves: Gruiformes: Salmilidae n. fam.) from the Middle Eocene of Messel (англ.) // Paleontologische Zeitschrift. — 2002. — Vol. 76, no. 2/2. — P. 305—316.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Strigogyps&oldid=107014634

Эта страница в последний раз была отредактирована 13 мая 2020 в 15:58.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.